
Übung zur Vorlesung
Einführung in die Numerische Mathematik
WS 2007/2008 — Blatt 4

Abgabe: 13.11.2007, vor der Vorlesung

Aufgabe 1 (Neumann-Reihe) (4 Punkte)
Sei X ein Banachraum und $T : X \rightarrow X$ stetig und linear mit $\|T\| < 1$. Sei S definiert durch

$$S := \sum_{n=0}^{\infty} T^n.$$

Zeigen Sie

- $S(x)$ ist für alle $x \in X$ wohldefiniert.
- S ist linear und stetig und $\|S\| \leq \frac{1}{1-\|T\|}$.
- $\text{Id} - T$ ist bijektiv und es ist $S = (\text{Id} - T)^{-1}$.

Aufgabe 2 (Störungssatz für lineare Gleichungssysteme) (4 Punkte)
Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär und $\|\cdot\|$ eine induzierte Matrixnorm. Sei $\Delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gegeben mit $\|\Delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ und $b, \Delta b \in \mathbb{R}^n$ mit $b \neq 0$. Sei $x \in \mathbb{R}^n$ die Lösung von $Ax = b$ und $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ die Lösung des gestörten Gleichungssystems $(A + \Delta A)\bar{x} = b + \Delta b$. Zeigen Sie:

- $A + \Delta A$ ist regulär.
- Für den relativen Fehler gilt $\frac{\|x - \bar{x}\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$.

Hinweis: Verwenden Sie Aufgabe 1 mit einer geeigneten Wahl von T .

Aufgabe 3 (LR-Zerlegung) (4 Punkte)

- Berechnen Sie die LR-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Führen Sie dabei alle (wesentlichen) Zwischenschritte auf.

- Unter Ausnutzung der Zwischenergebnisse berechnen Sie die Lösung von $Ax = b$ für $b = (2, 1, 2, -1)^T$.

Aufgabe 4 (Programmieraufgabe: Gauß-Verfahren)

(4 Punkte)

- a) Implementieren Sie eine Funktion, die das Gaussche Eliminationsverfahren zur Lösung eines linearen Gleichungssystems $Ax = b$, $x, b \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ realisiert. Es soll sowohl die Berechnung ohne als auch mit Spaltenpivotisierung (als Pivotelement wird also das betragsgrößte Element der jeweiligen Spalte gewählt) möglich sein. Die Entscheidung hierfür soll anhand eines weiteren Parameters beim Aufruf der Funktion erfolgen. Die durch die Pivotsuche entstandenen Zeilenvertauschungen sollen nicht explizit ausgeführt werden. Stattdessen werden die Zeilenvertauschungen in einem Integer-Feld gespeichert.
- b) Gegeben ist folgendes lineares Gleichungssystem für $n \in \mathbb{N}, n > 1$:

$$A_{ij} = \frac{i^{j-1}}{n(n-1)}, \quad b_i = i \quad \text{für } i, j = 1, \dots, n.$$

Ein Maß für den Fehler einer numerischen Lösung x ist das Residuum $Ax - b$. Bestimmen Sie die Maximumsnorm des Residuums $\|Ax - b\|_\infty$ zu den numerischen Lösungen Ihrer Implementation für $n = 10, 20, 50, 100$, mit und ohne Pivotisierung.